

Piombino, numerosi eccessi di mortalità e morbilità dallo studio Sentieri

Dallo studio Sentieri (5° aggiornamento), interamente scaricabile dal sito www.epiprev.it e da quello di Medicina democratica Livorno in due volumi, su 45 siti inquinati italiani svolto dal Ministero della salute, si rilevano numerose e notevoli criticità su Piombino. Le enumeriamo puntualmente, pensando che l'informazione sia la prima prevenzione. La bonifica non può attendere.

GIOVANI

(quando l'SRM o SHR superano 100, la situazione è negativa)

Mortalità per le principali cause in età pediatrica, adolescenziale e giovanile (0-29 anni) negli anni 2006-2013: 16 decessi per tutte le cause. La fascia di età più colpita è quella tra i 15 e i 19 anni, con un rapporto standardizzato (SMR) per età del **122**, poi quella tra i 20 e i 29 anni con SMR del **113**. Nel periodo osservato (8 anni), ci sono stati a Piombino 2 morti giovanissimi in più rispetto all'atteso toscano. Ci sono stati inoltre numerosi ricoverati per le principali cause in età pediatrica, adolescenziale e giovanile:

4.161 ricoverati

, con gli eccessi maggiori tra i giovani tra i 15/19 anni, e quelli tra i 20 e i 29 anni.

Tra le cause del ricovero spiccano "tutti i tumori" con SHR (rapporto standardizzato di ospedalizzazione) del **122** nella fascia di età 15-19 anni, e del **117** nella fascia da 0 a 19 anni.

Tra le patologie di ospedalizzazione spiccano vistosamente le leucemie, le leucemie linfoide e i tumori del sistema linfematopoietico totale, con tassi quasi doppi dell'atteso, specialmente nella fascia tra 0 e 19 anni di età.

Per i linfomi non Hodgkin spiccano gli eccessi nella fascia 20-29 anni (**SHR 191**), quasi doppio

Piombino. numerosi eccessi di mortalità e morbilità

Scritto da Maurizio Marchi

Domenica 16 Giugno 2019 07:38 -

rispetto all'attesa.

Malformazioni congenite in forte eccesso a Piombino negli anni 2002-2015 e sono ben 109 (8 malformazioni in più l'anno): le malformazioni più diffuse sono al cuore, agli arti, al palato-labbro, ai genitali. Piombino ha il triste primato percentuale delle malformazioni, rispetto addirittura a Taranto, ma anche a Livorno e Massa-Carrara (Percentuali di Sentieri).

2002-2015

Nati

MC osservate

Percentuale su 10.000 nati

Piombino

Piombino. numerosi eccessi di mortalità e morbilità

Scritto da Maurizio Marchi

Domenica 16 Giugno 2019 07:38 -

3.332

109

327

Livorno

20.153

576

285

Piombino. numerosi eccessi di mortalità e morbilità

Scritto da Maurizio Marchi

Domenica 16 Giugno 2019 07:38 -

Taranto

25.853

600

232

Massa Carrara

14.350

314

218

ADULTI

(quando l'SRM o SHR superano 100, la situazione è negativa)

“Si segnala un numero di decessi per **pneumoconiosi** negli uomini di 5 volte superiore all'atteso regionale (29 osservati;

498

(tab PIO mor), riferibile ragionevolmente a esposizioni di tipo professionale, e per le **cardiopatie ischemiche**

, patologia per la quale si osservano nel sito eccessi di mortalità (uomini: 252 osservati;

SMR=117

– donne: 257 osservati;

SMR=125

) e di

ricoverati

(uomini: 805 osservati;

SHR=114

SMR=
)

Piombino. numerosi eccessi di mortalità e morbilità

Scritto da Maurizio Marchi

Domenica 16 Giugno 2019 07:38 -

– donne: 515 osservati;

SHR=127

(PIO ric).

Tra le cause di ricovero, si segnala un eccesso di tumori maligni della ghiandola tiroidea (uomini: 28 osservati; SHR=173 – donne: 66 osservati; SHR=167.”

Nota del redattore: La pneumoconiosi è un'affezione dei polmoni provocata dall'inalazione di polveri. Il termine viene utilizzato per indicare diversi quadri di fibrosi polmonari da inalazione di polveri per cause lavorative: l'amianto, la silice, il talco e i metalli.

15.6.19

Maurizio Marchi per Medicina democratica Livorno e prov.